



# จดหมายข่าว

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

## การใช้ยา Tramadol




### Tramadol ในเด็ก

- USA : ไม่มีข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพเพียงพอ จึงไม่มีข้อมูลขนาดยานี้แนะนำในเด็ก เด็กที่ใช้ยานี้อาจเสี่ยงเกิดการกดระบบหายใจที่อาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
- Micromedex, 2023** เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่ควรได้รับยานี้ เนื่องจากอาจเสี่ยงเกิดปัญหา ระบบทางเดินหายใจที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
- UK : ได้รับการจดทะเบียนให้ใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และสามารถให้ยาในขนาดทั่วไปที่ใช้ในผู้ใหญ่
- บางประเทศในยุโรป : ได้รับ licensed ให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่านั้นได้ ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ฝรั่งเศส FR มีขนาดแนะนำในเด็กอายุมากกว่า 3 ปี คือ 1-2 mg/kg orally และสามารถให้ซ้ำได้วันละ 3-4 ครั้ง ส่วนเยอรมัน DE แนะนำขนาดยาดังกล่าว ใช้ได้ในเด็กอายุต่ำกว่านั้น เช่น 1 ปี



### Tramadol ในผู้ที่มีปัญหาไต

- ควรเว้นความถี่การให้ยาเป็นทุก 12 ชั่วโมง ในคนไข้ที่มีปัญหาไต โดยคนไข้ที่มี CrCl น้อยกว่า 30 ml/min ขนาดยาสูงสุดไม่ควรเกิน 200 mg/day
- ในรายที่มีปัญหาไตรุนแรง เช่น CrCl น้อยกว่า 10 ml/min จะไม่แนะนำให้ใช้ยานี้



### Tramadol ในผู้ที่มีปัญหาในตับ

- ควรเว้นความถี่การให้ยาเป็นทุก 12 ชั่วโมง
- ใน Cirrhosis แนะนำเป็น Tramadol 50 mg q 12 hr

